

## 苦苣苔科一新组合

王文采 李振宇

(中国科学院植物研究所, 北京, 100044)

## A NEW COMBINATION OF THE GESNERIACEAE

WANG WEN-TSAI LI ZHEN-YU

(Institute of Botany, Academia Sinica, Beijing 100044)

### 深紫吊石苣苔

*Lysionotus himalayensis* (Lévl.) W. T. Wang et Z. Y. Li, comb. nov.  
—— *Hemiboea himalayensis* Lévl. in Repert. Sp. Nov. 9: 329. 1911; Lauener et Burtt in Not. R. Bot. Gard. Edinb. 38(3): 468. 1980. — *Lysionotus atropurpureus* Hara in Journ. Jap. Bot. 48: 359, fig. 4. 1973; Fl. East. Himsl. 3rd rep. 105, pl. 6, a. 1975; W. T. Wang in Guihaia 3: 268. 1983; et in Fl. Reipubl. Popul. Sin. 69: 540, pl. 148, fig. 7. 1990, syn. nov.

分布: 我国西藏东南部; 尼泊尔、锡金。

*Hemiboea himalayensis* Lévl. 依据采自于锡金 Sikkim 的植物标本, 但原作者在描述此种时未引出标本, 现只留下一张图版存于爱丁堡植物园标本馆(E)(Lauener & Burtt 1980, 见上引文献), 根据原拉丁描述及此图版, 我们肯定此植物与原宽描述的 *Lysionotus atropurpureus* Hara 为同一种植物, 因此, 后一拉丁学名当予归并, 成为异名。